

Bandamadine

Bandfink

<i>Ordnung:</i>	Sperlingsvögel (Passeriformes)
<i>Unterordnung:</i>	Singvögel (Passeri)
<i>Familie:</i>	Prachtfinken (Estrildidae)
<i>Gattung:</i>	Amadinen (<i>Amadina</i>)
<i>Art:</i>	Bandamadine



Die **Bandamadine** (*Amadina fasciata*) ist eine Prachtfinkenart und gehört innerhalb dieser Familie zu den Arten, die ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet in Afrika haben. Sie kommt dort von Senegal bis ins östliche Äthiopien und Somalia sowie südlich bis ins nördliche Mosambik, Simbabwe und Botswana vor.

Die Vögel erreichen eine Körperlänge bis zu 12 Zentimeter. Die Körperfiederung ist bräunlich, die Weibchen sind etwas heller gefärbt als die Männchen. Diese haben außerdem ein rotes Kehlbild. Unter den als Ziervogel gehaltenen Varietäten sind verschiedene Farbschläge erhältlich.

Der Gesang der Vögel ist schnurrend oder brummend.

Bandamadinen sind Halbhöhlenbrüter. Das Weibchen legt zwischen 4 und 6 Eier, die Brutdauer beträgt 12 bis 14 Tage. Im Gegensatz zu den meisten anderen Prachtfinken halten die Jungvögel der Bandfinken ihr Nest sauber, indem sie ihren Kot aus der Nestöffnung herausspritzen und nicht im Nest absetzen.