

Halsbandsittich

<i>Ordnung:</i>	Papageien (Psittaciformes)
<i>Familie:</i>	Eigentliche Papageien (Psittacidae)
<i>Unterfamilie:</i>	Edelpapageien (Psittaculinae)
<i>Gattung:</i>	Edelsittiche (<i>Psittacula</i>)
<i>Art:</i>	Halsbandsittich



Unterarten

Es gibt vier allgemein anerkannte Unterarten:

Afrikanischer Halsbandsittich (*Psittacula krameri krameri*)

Neumanns Halsbandsittich (*Psittacula krameri borealis*)

Indischer Halsbandsittich (*Psittacula krameri manillensis*)

Abessinischer Halsbandsittich (*Psittacula krameri parvirostris*)

Verbreitung

Halsbandsittiche kommen in vier Unterarten vor. Das natürliche Verbreitungsgebiet der afrikanischen Unterarten *Psittacula krameri krameri* und *P. k. parvirostris* erstreckt sich in Afrika vom Senegal und Guinea in einem breiten Band durch den Sahel und die Savanne bis nach Eritrea. In Asien leben die Unterarten *P. k. borealis* und *P. k. manillensis* in einem Gebiet, das den gesamten indischen Subkontinent sowie Pakistan, Bangladesch, Myanmar und Sri Lanka umfasst.

Halsbandsittich in Bonn, Poppelsdorfer Allee, nahe dem Botanischen Garten, wo die Vögel brüten

Als Neubürger (Neozoen), der Bestände aus Gefangenschaftsflüchtlingen aufbauen konnte, ist er in zunehmendem Maße in den städtischen Gebieten der nördlichen Mittelmeerländer zu finden, wo er sich, wie anderswo auch, als ausgesprochener Kulturfolger erweist.