

Veilchenlory

Psitteuteles goldiei



Vorkommen

Veilchenloris kommen nur auf Neuguinea vor und bevorzugen dort Bergwälder, die sie auf der Suche nach blühenden Bäumen durchstreifen.

Geschlechtsunterschiede:

Geringfügige äussere Geschlechtsmerkmale sind bekannt. Ausgewachsene Männchen sind etwas kräftiger und schwerer als die Weibchen. Auch der Oberkopf ist bei ihnen stärker rot gefärbt. Eine sichere Geschlechtsbestimmung ist aber nur anhand einer DNA- Analyse möglich. Jungtiere haben nur etwas Rot auf der Stirn.

Sozialverhalten:

Veilchenloris weisen ein komplexes Sozialverhalten auf. Gewöhnlich kommen die geselligen Vögel ausserhalb der Brutzeit in Familienverbänden, kleinen Trupps oder in Gruppen von bis zu 40 Vögeln vor.

Ernährung:

Grundfutter ist eine Lorisuppe. ausserdem Früchte (weiche Birnen, Äpfel, Weintrauben), gequollene Hirse, Glanz und andere kleine Sämereien. Auch grüne Pflanzenteile und unreife Samen von Wildkräutern werden gerne angenommen. Lebendfutter muss regelmässig angeboten werden. Das sehr leicht verderbliche Futter muss täglich erneuert werden, bei sommerlichen Temperaturen mehrmals täglich.